


تعطى الصيغ الحرفية (مع التاطير) قبل التطبيقات العددية

❖ الفيزياء (12,50 نقطة) (80 دقيقة)

التطبيق

التمرين الأول : قياس قطر خيط نسيج العنكبوت عن طريق ظاهرة حيود الضوء (7,00 نقطة)

أثناء حصة الأشغال التطبيقية بالثانوية التأهيلية أيت باها، سال الأستاذ "رشيد جنكل" تلاميذ الثانية علوم فيزيائية ما إذا كانوا يستطيعون قياس قطر خيط نسيج العنكبوت بالمسطرة المدرجة .




فجاءت الأجوبة على الشكل التالي :

المجموعة الأولى : لا يمكن لأن سمك خيط نسيج العنكبوت صغير جدا ولا يمكن قياسه بالمسطرة المدرجة.....

المجموعة الثانية : تتفق مع المجموعة الأولى لكن يمكن قياسه عن طريق ظاهرة حيود الضوء التي درسناها في الدرس الماضي..

وللحقيقة من ذلك اقترحت **المجموعة الثالثة** مع الأستاذ التجربة الموجودة أسفله وطلبت منهم الإجابة عن الأسئلة التالية :

1. إبراز ظاهرة حيود الضوء وتحديد العوامل المؤثرة عليها :

نضيء صفيحة بها شق رأسي عرضه a بواسطة ضوء أحادي اللون منبعث من جهاز لازر تردد $N = 4,44 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ وطول موجته λ . توجد الصفيحة على مسافة $D = 50 \text{ cm}$ من شاشة فنحصل على الشكل جانبه. (الشكل 1) .

$$\text{سرعة الضوء في الفراغ } c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

نعتبر معامل انكسار الهواء يساوي 1

1.1 صف ما تشاهد على الشاشة ، ؟ ثم ما طبيعة الضوء التي تبرزها هذه التجربة

2.1 أعط العلاقة بين الفرق الزاوي θ وعرض الشق a وطول الموجة λ للضوء الأحادي اللون المستعمل

3.1 أوجد العلاقة بين λ و a و D و L_1 عرض البقعة المركزية. نعطي $\tan \theta \approx \theta$

4.1 استنتاج العوامل المؤثرة على ظاهرة الحيود

5.1 أحسب طول الموجة λ ب nm واستنتاج عرض الشق a إذا علمت أن $L_1 = 6,7 \text{ mm}$.

2. تاثير وسط الانتشار على ظاهرة الحيود

نضع بين الصفيحة والشاشة قطعة زجاج على شكل متوازي المستطيلات كما في الشكل (2). معامل انكسار الزجاج بالنسبة


للضوء المستعمل سابقا هو $n = 1,61$. نلاحظ على الشاشة أن عرض

البقعة الضوئية المركزية يأخذ قيمة L_2

1.2 حدد تعبير λ طول الموجة الضوئية في الزجاج بدلالة n و λ طول الموجة الضوئية في الفراغ . ثم أحسب قيمته

2.2 إستنتاج تعبير L_2 طول البقعة المركزية بدلالة L_1 و n ثم احسب قيمته

3.2 إستنتاج عامل آخر يؤثر على ظاهرة الحيود



3. تحديد قطر خيط نسيج العنكبوت :

ن 0,75

نحتفظ بالمنبع الضوئي والشاشة في موضعهما ، نزيل القطعة الزجاجية والصفحة ، ونضع مكان الشق خيطا رأسيا من نسيج العنكبوت . نقيس عرض البقعة المركبة على الشاشة فنجد $L_3 = 1 \text{ cm}$. حدد d قطر خيط نسيج العنكبوت.

التمرين الثاني : دراسة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء (5,50 نقط) (40 دقيقة)

في إطار مشروع "الفيزياء للجميع" الذي اطّره كل مساء يوم الجمعة والمتمثل في إنجاز جميع تجارب مادة الفيزياء والكيمياء للسلك الثانوي التأهيلي بلمسات المتعلمين ، قام التلميذ " عبد الله بوديه " من السنة الثانية من سلك البكالوريا شعبة علوم فيزيائية يوم الجمعة الماضي بدراسة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء محددا كل من λ طول الموجة و v سرعة الانتشار لهذه الموجة في الهواء. اليكم التجربة المنجزة :



عموميات حول الموجات فوق الصوتية

ن 0,5

1. ما طبيعة الموجات فوق الصوتية
2. ما الفرق بين الموجات الصوتية والموجات فوق الصوتية

ن 0,5

انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء


على مسطرة مدرجة نضع باعثا E للموجات فوق الصوتية ومستقبلين R_1 و R_2 لتلقي الموجات بحيث يكون الбаاعث E و المستقبلان على نفس الاستقامة وفق المسطرة المدرجة. يرسل البااعث موجة فوق صوتية متتالية جيبية تنتشر في الهواء

وتحصل إلى المستقبليين R_1 و R_2 . على شاشة كاشف التذبذب و عبر المدخلين Y_1 و Y_2 نعاين الموجات المتقططة من طرف المستقبليين (الشكل 1).

نعطي الحساسية الأفقية لراسم التذبذب 2.10^6 s/div

عندما يوجد المستقبلان R_1 و R_2 معا عند التدريجة 4cm ، نلاحظ على شاشة راسم التذبذب أن المنحنيان الموفقة للإشارتين المتقطعتين من طرف R_1 و R_2 يوجدان على توافق في الطور.

ترك R_1 ثابت و نبعد R_2 وفق المسطرة المدرجة، فنحصل على أول نقطة يكون فيها المنحني الموافق للإشارة المتقطعة من طرف R_2 على تعاكس في الطور مقارنة مع منحني الموافق للإشارة المتقطعة من طرف R_1 عند التدريجة 5,7cm (الشكل 2)



شكل 2

شكل 1

ن 0,75

3. حدد المنحني الموافق للإشارة المتقطعة من طرف المستقبلي R_1 و R_2 مع التعليل

ن 1

4. حدد T دور الموجة فوق الصوتية المستقبلة من طرف R_1 و R_2 واستنتج N ترددتها

ن 1

5. حدد λ طول الموجة للموجة فوق الصوتية

ن 0,75

6. استنتاج v سرعة انتشارها في الهواء

ن 1

7. نحتفظ بعناصر التركيب التجاري في موضعها ثم نزيل المستقبلي R_1 يسارا حتى يصل التدريجة 2,3cm ارسم ما

ستلاحظه على شاشة راسم التذبذب مع التعليل

تمرين الثالث: التتبع الزمني لتحول كيميائي عن طريق المواصلة ، سرعة التفاعل

2-برومو-2-مثيل بروبان ، مركب عضوي سائل صيغته CH_3_3CBBr ، ولتبسيط نرمز له بـ RBr يعطي هذا المركب مع الماء تفاعلاً كلياً يتم وفق المعادلة الحصيلة التالية :




لتتبع حركة هذا التحول ، نحضر في كأس خليطاً يتكون من :

• من RBr مع كمية قليلة من المذيب البروبانول $V_1 = 1mL$

• من الماء المقطر $V_2 = 99mL$

نقيس G مواصلة الوسط التفاعلي بواسطة مقياس المواصلة ثابتة خليته $m^{-2} K = 10$.

يعطي المنحنى الممثل في الشكل أسفله ، تطور المواصلة G بدالة الزمن t .



1. تحقق أن كمية مادة المركب RBr البدئية هي $n_0(RBr) \approx 6.35mmol$ ن 0,5
 2. أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل ن 1
 3. أحسب التقدم الأقصى x_m ، علماً أن المركب RBr هو المتفاعل المحدد ، ن 0,5
 4. عين مبيانياً قيمة المواصلة القصوية G_m ن 0,5
 5. أوجد تعبير المواصلة G . عند اللحظة t بدالة تقدم التفاعل x و V_s حجم الخليط و K و $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Br^-} . ن 1
 6. بين أن تعبير تقدم التفاعل x يمكن كتابة على الشكل : $x = x_m \cdot \frac{G}{G_m}$ ن 1
 7. بين أن تعبير السرعة الحجمية للتفاعل يمكن كتابة على الشكل التالي : $v = 9,9 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{dG}{dt}$ حيث G بـ mS ، v بـ min^{-1} ، t بـ min . ثم أحسب قيمة G عند اللحظة $t=0$ ن 1,5
 8. كيف تتغير السرعة الحجمية للتفاعل مع الزمن ؟ وما العامل المتحكم في ذلك ن 0,5
 9. عرف $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل ثم حدد قيمته ن 1
- نعطي : كثافة RBr هي $d=0,87$ g. mL^{-1} ، الكتلة الحجمية للماء $M(RBr) = 137g. mol^{-1}$

الله ولي التوفيق



حظ سعيد للجميع

البرت اينشتاين « الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة »